

Kinder oder Jugendliche mit COVID-19 kompatiblen Symptomen¹

>10 Jahre

Testen lt. Verdachtsfalldefinition, bei positivem Resultat: Absonderung und Kontaktpersonennachverfolgung lt. behördlichen Vorgaben

≤10 Jahre

Gesicherte Alternativdiagnose

Ja

mit Fieber (Körpertemp. ≥38,0°C)

Nein

ohne Fieber (Körpertemp. <38,0°C)

Testung

Mittels PCR Test

Ja

Kontakt zu einem bestätigten Fall ODER wohnt mit einer Person, die zu einer Risikogruppe³ gehört

Nein

Kinder ≤10 Jahre mit COVID-19 kompatiblen Symptomen in Gebieten mit erhöhter Virusaktivität sowie RisikopatientInnen² ≤10 Jahre mit COVID-19 kompatiblen Symptomen¹ bzw. Patient:innen, die im Krankenhaus aufgenommen werden sollten großzügig getestet werden.

Negativ

Positiv

zu Hause bleiben bis 24h nach Abklingen der Symptome

Absonderung als Kontaktperson lt. behördlichen Vorgaben ODER falls kein Kontakt zu einem bestätigten Fall, zu Hause bleiben bis 24h nach Abklingen der Symptome

Absonderung UND Kontaktpersonennachverfolgung lt. behördlichen Vorgaben

zu Hause bleiben bis 24h nach Abklingen der Symptome (ausgenommen isolierte Rhinorrhoe)

¹ ≤10a: Akuter Infekt der oberen oder unteren Atemwege, Pharyngitis, non purulente Konjunktivitis, Erbrechen und Durchfall, plötzlich aufgetretene Anosmie und Ageusie
>10a: siehe Falldefinition der BMSGPK (<https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavirus.html>)
² Schwere Lungen- oder Herzerkrankungen, PatientInnen unter Chemotherapie, schwere neuromuskuläre Erkrankungen, immunsupprimierte PatientInnen, Adipositas Grad II und III
³ Laut Empfehlung des Sozialministeriums (www.sozialministerium.at)